



Los medicamentos que NO se deben tomar tres semanas antes de la cirugía

Introducción

Muchos de los analgésicos que tomamos contienen compuestos que reducen la capacidad de la sangre para formar un coágulo, y esto puede causar hemorragia durante y después de la cirugía. Desafortunadamente, la cirugía se deberá posponerse si estos medicamentos se toman durante las de 3 semanas anteriores a la cirugía. En caso de duda, consulte con su médico de cabecera.

- Paracetamol y codeína: NO afectan a la coagulación de la sangre y se pueden tomar en cualquier momento antes de la cirugía.
- Warfarina y clopidogrel: Estos nunca se deben suspender o cambiar sin consultar a su médico de cabecera o a su cardiólogo.

Alimentos / comprimidos que deben evitarse 3 semanas antes de la cirugía:

(1) ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS HERBOLARIOS

- Todos los alimentos picantes (por ejemplo, curry)
- Ajo, jengibre, ginseng, ginkgo biloba, "la Garra del Diablo "

(2) MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ASPIRINA

La aspirina está presente en muchos medicamentos. Algunos de los medicamentos presentados a continuación son los nombres comerciales comunes que contienen aspirina.

- Incluye pastillas para el dolor de la artritis y la espalda
- ASPIRINA
- ACTRON
- ALKA SELTZER
- ANADIN
- ANADIN EXTRA SOLUBLE
- ANADIN MAX FUERZA

ASOS

- ANGETTES
- ASKIT
- ASPAV
- ASPIRINA B.P
- ASPIRINA BAYER
- ASPRO
- ASPRO CLARO
- BEECHAMS LIMÓN TABLETAS
- BEECHAMS EN POLVO
- SELTZER BOOTS
- CAPRIN
- CO-CODAPRIN
- CODIS 500
- COJENE
- DISPRIN
- DISPRIN DIRECTO
- DISPRIN EXTRA
- DRISTAN TABLETAS
- FEMIGRAINE DOLOXNENE
- FYNNON CALCIO
- POLVOS MRS CULLEN
- ENFERMERA SYKES EN POLVO
- NU-SEALS ASPIRINA
- PHENSIC
- LABOPRIN DL
- EQUAGESIC

(3) ANTI INFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES (AINES)

- Incluye pastillas para el dolor de la artritis y la espalda
- ACECLOFENACO: Preservex
- ACEMATACIN: Emflex
- AZAPROPAZONA: Rheumox
- CELECOXIB: Celebrex
- DEXIBUPROFENO: Seractil
- DEXKETOPROFENP: Keral
- DICLOFENACO: Arthrotec, Diclomax SR, Diclomax retard, Motifene, Voltaren, Voltaren retard, Voltaren rápido
- ETODOLAC: Etodolac, Lodine SR
- ETORICOXIB: Arcoxia
- FENBUFENO: Fenbufeno, Lederfen
- FENOPROFENO: Fenopron
- FLUBIPROFENO: Froben, Froben SR
- IBUPROFENO: Brufen, Brufen retard, Fenbid, Codafen continua, Nurofen
- INDOMETACINA: Indometacina, Indocid
- KETOPROFENOP: Ketoprofeno, Orudis, Oruvail Gel

ASOS

Dr A. Amias, Dr M Gonzales Candial, Dr E Basauri, Dr J Gelabert, Dr R Malhotra, Dr D Verity

www.ASOS.eu.com

- **ÁCIDO MEFENÁMICO:** Ácido mefenámico, Ponstan
- **MELOXICAM:** Mobic
- **NABUMETONA:** Nabumetona, Reliflex
- **NAPROXÉN:** naproxeno, Naprosyn, Synflex, Napratec
- **NEUROFEN**
- **PIROXICAM:** Piroxicam, Feldene, Brexidol
- **SULINDAC:** Sulindac, Clinoril
- **TENOXICAM:** Mobiflex
- **ÁCIDO TIAPROFÉNICO:** Ácido tiaprofénico, Surgram

(4) AGENTES ANTIPLAQUETARIOS (consulte con su médico de cabecera o cardiólogo)

Clopidogrel (usado después de stent coronario arterial)